

Tabelle 1

**Empfohlene Basisimpfungen 2023**

Stand 2023

Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen und des Bundesamtes für Gesundheit.

Alter	Diphtherie (D/d) <sup>1)</sup> Tetanus (T) <sup>2)</sup> Pertussis (P <sub>a</sub> /p <sub>a</sub> ) <sup>1)</sup>	<i>Haemophilus influenzae</i> Typ b (Hib)	Polio- myelitis (IPV) <sup>4)</sup>	Hepa- titis B (HBV)	Pneumo- kokken	Masern (M) Mumps (M) Röteln (R)	Varizellen (VZV)	Humane Papilloma- viren (HPV)	Influenza
<b>2 Monate</b>	DTP <sub>a</sub>	Hib	IPV	HBV <sup>6)</sup>	PCV				
<b>4 Monate</b>	DTP <sub>a</sub>	Hib	IPV	HBV <sup>6)</sup>	PCV				
<b>9 Monate</b>						MMR <sup>9)</sup>	VZV <sup>9)</sup>		
<b>12 Monate *</b>	DTP <sub>a</sub>	Hib	IPV	HBV <sup>6)</sup>	PCV	MMR <sup>9)</sup>	VZV <sup>9)</sup>		
<b>4–7 Jahre</b>	DTP <sub>a</sub> / dTp <sub>a</sub> <sup>1)</sup>		IPV <sup>4)</sup>			10)	11)		
<b>11–14/ 15 Jahre</b>	dTp <sub>a</sub>		5)	HBV <sup>6) 7)</sup>		10)	11)	HPV <sup>13)</sup>	
<b>25 Jahre</b>	dTp <sub>a</sub> <sup>3)</sup>		5)	8)		10)	12)		
<b>45 Jahre</b>	dT <sup>3)</sup>		5)	8)		10)	12)		
<b>≥ 65 Jahre</b>	dT <sup>3)</sup>		5)	8)					jährlich

Kombinationsimpfung

\* Die im Alter von 12 Monaten empfohlenen drei Impfungen (je 1 Dosis eines DTP<sub>a</sub>-IPV-Hib-HBV-, Pneumokokken- und MMRV-Impfstoffs) können gleichzeitig oder in beliebig kurzen Abständen zueinander verabreicht werden. Die Impfung gegen DTP<sub>a</sub>-IPV-Hib-HBV und Pneumokokken soll vor dem Alter von 13 Monaten abgeschlossen sein. Die Impfung gegen DTP<sub>a</sub>-IPV-Hib-HBV kann vor dem Alter von 12 Monaten, mindestens aber im Alter von 11 Monaten, verabreicht werden.